


INFORMACJE DLA PACJENTÓW PRZED LECZENIEM STOMATOLOGICZNYM POD ANALGOSEDACJĄ



BADANIA PRZED SEDACJĄ W STOMATOLOGII U DOROSŁYCH:




1. Morfologia krwi z rozmazem;
2. Koagulogram;
3. Badania biochemiczne krwi: potas, sód, wapń, mocznik, kreatynina, bilirubina całkowita, glukoza, ALT, AST;
4. Elektrokardiogram (EKG);
5. W razie potrzeby: krew na wirusowe zapalenie wątroby typu B (antygen HBV), typu C (antygen HCV), HIV;
6. Nie jeść i nie pić przez 4 godziny przed sedacją oraz nie chorować.



PODSTAWOWYM WARUNKIEM LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO JEST **SKUTECZNE ZNIECZULENIE**

Pomimo postępów w miejscowym znieczuleniu, coraz popularniejszym wśród lekarzy i pacjentów staje się leczenie stomatologiczne pod analgosedacją. Metoda ta jest skuteczna przy długotrwałych, traumatycznych zabiegach w jamie ustnej, dużej objętości leczenia, skomplikowanych ekstrakcjach kilku zębów oraz u osób, które boją się dentysty.



Na dzień przed zabiegiem anestezjolog przeprowadza wywiad w celu oceny stanu zdrowia oraz zleca badania:

- W przypadku stałego przyjmowania leków należy uzgodnić ich przyjmowanie w dniu leczenia z anestezjologiem;
- Przed leczeniem pod analgosedacją nie wolno jeść i pić przez 4 godziny, aby zapobiec przedostaniu się pokarmu do dróg oddechowych;
- Leczenie stomatologiczne pod narkozą lub sedacją należy odłożyć w przypadku choroby z gorączką, kaszlem, katarrem, biegunką i zmianami w jamie ustnej;
- Należy zdjąć soczewki kontaktowe, okulary, łańcuszki;
- Należy założyć koszulkę z krótkim rękawem.

Pacjenci odbierają leczenie pod analgosedacją jako przyjemny sen, nie pozostawia ono żadnych **wspomnień ani nieprzyjemnych odczuć**. Nowoczesne leki stosowane w narkozie i sedacji są bezpieczne, łatwe do kontrolowania i szybko wydalane z organizmu, dlatego pacjenci szybko budzą się, samodzielnie opuszczają gabinet i bezpiecznie wracają do domu.

Przez 30–60 minut po zabiegu pacjent pozostaje pod obserwacją personelu medycznego. W tym czasie mogą utrzymywać się pozostałości działania leków (senność).



DO RZADKO OBSERWOWANYCH DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH NALEŻĄ: **SENNOŚĆ, ZAWROTY GŁOWY, NUDNOŚCI.**

- Przygotowanie pacjenta przez anestezjologa, eliminacja stresu wewnątrzoperacyjnego oraz monitorowanie funkcji życiowych podczas leczenia stomatologicznego to klucz do pomyślnego okresu pooperacyjnego;
- Pacjent i osoba towarzysząca otrzymują od anestezjologa i stomatologa zalecenia dotyczące picia, odżywiania, przyjmowania leków i transportu po analgosedacji;
- Do domu należy wracać samochodem osobowym pod opieką osoby towarzyszącej, która siedzi na tylnym siedzeniu. Nie należy korzystać z transportu publicznego;
- Przez 24 godziny po potencjonowanym lub ogólnym znieczuleniu zabrania się prowadzenia pojazdów i podpisywania dokumentów prawnych;
- W razie wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta w domu po sedacji lub narkozie prosimy o kontakt telefoniczny ze stomatologiem lub anestezjologiem.

Pajkush Władimir Andriejewicz, doktor nauk medycznych, anestezjolog najwyższej kategorii.



+48 22 257 12 871
0443344100
www.parodent.pl

