


I ZAŁOŻONO CI **IMPLANT**


I CO MOŻE SIĘ **POJAWIĆ?**

- Lekka słabość;
- Drętwienie po znieczuleniu miejscowym (4-6 godzin);
- Uczucie ucisku na dziąsło w miejscu implantu;
- Obrzęk policzka, umiarkowany ból;
- Obrzęk policzka, umiarkowany ból.




CO SZKODZI IMPLANTOWI W PIERWSZE 2 TYGODNIE:

- Używanie szczoteczek elektrycznych w pierwszym miesiącu;
- Twarde jedzenie;
- Skoki temperatur;
- Nadmierny wysiłek;
- Alkohol, bardzo gorące lub zimne potrawy;
- Palenie (jeśli nie możesz rzucić, ogranicz do minimum).



„CZERWONE FLAGI” – GDY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA:

- Ból, obrzęk, drętwienie utrzymujące się ponad 7 dni lub nasilające się;
- Gorączka 5 dnia po implantacji;
- Nieustające krwawienie z dziąsset;
- Rozchodzenie się szwów;
- Ruchomość implantu, ubytek korony.



Te objawy mogą świadczyć o rozwoju powikłań, dlatego w przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie poinformować stomatologa i zgłosić się na badanie!



+48 22 257 12 871

0443344100

www.parodent.pl