

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ ПОД АНАЛЬГОСЕДАЦИЕЙ



### ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД СЕДАЦИЕЙ В СТОМАТОЛОГИИ У ВЗРОСЛЫХ:



1. Общий анализ крови с формулой;
2. Коагулограмма;
3. Биохимическое обследование крови: калий, натрий, кальций, мочевины, креатинин, общий билирубин, сахар, АЛТ, АСТ;
4. Электрокардиограмма (ЭКГ);
5. При необходимости: кровь на гепатит В (HBV-антиген), гепатит С (HCV-антиген), ВИЧ;
6. 4 часа не есть и не пить перед седацией и не заболеть.

## ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВЕННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Несмотря на широкий прогресс эффективного местного обезболивания, в последнее время всё более популярным среди врачей и пациентов становится стоматологическое лечение под анальгоседацией. Этот метод обезболивания эффективен при длительных травматичных вмешательствах в полости рта, большом объёме лечения, сложном удалении нескольких зубов, всем, кто «боится стоматолога» и др.

Накануне анестезиолог общается с пациентом для выявления особенностей общего состояния, назначаются обследования:

- При постоянном приёме лекарств - их употребление в день лечения нужно заранее согласовать с анестезиологом;
- Перед лечением под анальгоседацией нельзя есть и пить в течение 4 часов, чтобы предотвратить попадание пищи в дыхательные пути;
- Стоматологическое лечение под наркозом или седацией нужно отложить при заболевании с температурой, кашлем, насморком, поносом и высыпаниями в ротовой полости;
- Контактные линзы, очки, цепочки необходимо снять;
- Нужно надеть футболку с короткими рукавами.

Стоматологическое лечение под анальгоседацией пациентами **воспринимается как приятный сон, не оставляет никаких воспоминаний и неприятных ощущений.** Современные препараты для наркоза и седации безопасны, легко управляемы и быстро выводятся из организма, поэтому пациенты быстро просыпаются, самостоятельно покидают стоматологический кабинет и безопасно возвращаются домой.

В течение 30-60 минут после операции пациент находится под наблюдением медперсонала. В это время может сохраняться остаточное действие препаратов (сонливость).

## К ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ, КОТОРЫЕ НАБЛЮДАЮТСЯ РЕДКО, ОТНОСЯТСЯ: СОНЛИВОСТЬ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ТОШНОТА

- Медикаментозная подготовка пациента анестезиологом, ликвидация интраоперационного стресса, мониторинг жизненно важных функций организма во время стоматологического лечения - залог успешного послеоперационного периода;
- Рекомендации по питью, кормлению, приёму лекарств, транспортировке пациента после анальгоседации пациент и сопровождающее его лицо получают от анестезиолога и стоматолога;
- Домой следует добираться на легковом автомобиле под присмотром сопровождающего на заднем сиденье. Не следует пользоваться общественным транспортом;
- В течение 24 часов после проведения потенцированного или общего обезболивания запрещается управлять транспортным средством и подписывать юридические документы;
- В случае возникновения сомнений по общему состоянию пациента дома после седации или наркоза просим по телефону связаться со стоматологом или анестезиологом.

**Пайкуш Владимир Андреевич**, кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог высшей квалификационной категории.



+48 22 257 12 871

0443344100

[www.parodent.pl](http://www.parodent.pl)