


## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПЕРЕД СТОМАТОЛОГІЧНИМ ЛІКУВАННЯМ ПІД АНАЛЬГОСЕДАЦІЄЮ



### ОБСТЕЖЕННЯ ПЕРЕД СЕДАЦІЄЮ В СТОМАТОЛОГІЇ **У ДОРΟΣЛИХ:**




1. Загальний аналіз крові з формулою;
2. Коагулограма;
3. Біохімічне обстеження крові: калій, натрій, кальцій, сечовина, креатинін, загальний білірубін, цукор, АЛТ, АСТ;
4. Електрокардіограма (ЕКГ);
5. При потребі: кровна гепатит В (HBV антиген), гепатит С (HCV антиген), СНІД;
6. 4 години не їсти і не пити перед седацією та не захворіти.



## ОСНОВНОЮ УМОВОЮ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ **Є ЯКІСНЕ ЗНЕБОЛЕННЯ**

Проте, не дивлячись на широкий розвиток ефективного місцевого знеболення, останнім часом все більш популярним серед лікарів та пацієнтів є стоматологічне лікування під анальгоседацією. Даний метод знеболення є ефективним при тривалих травматичних втручаннях в порожнині рота, великому об'ємі лікування, складному видаленню декількох зубів, усім, хто «боїться стоматолога», тощо.



**Напередодні анестезіолог спілкується з пацієнтом з метою виявлення особливостей загального стану пацієнта, призначаються обстеження:**

- При постійному прийомі ліків - їх вживання в день лікування треба заздалегідь узгодити з анестезіологом;
- Перед лікуванням під анальгоседацією не можна їсти та пити протягом 4 годин з метою запобігання попадання їжі в дихальні шляхи;
- Стоматологічне лікування під наркозом або седацією треба відкласти у випадку захворювання, що протікає з гарячкою, кашлем, нежиттю, проносом та висипанням в роті;
- Контактні лінзи, окуляри, ланцюжки необ- хідно зняти;
- Потрібно одягнути футболку з короткими рукавами.

Стоматологічне лікування під анальгоседацією пацієнтами **відчувається як приємний сон не залишає ніяких спогадів та неприємних відчуттів.** Сучасні препарати для наркозу і седації є безпечними, легко керовані та швидко виводяться з організму, тому пацієнти швидко прокидаються, самостійно покидають кабінет стоматолога і безпечно повертаються додому.


Впродовж 30-60 хв. після операції пацієнт перебуває під наглядом медперсоналу. В цей час ще може утримуватись залишкова дія медикаментів (сонливість).



## ДО ПОБІЧНИХ ДІЙ, ЩО СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ РІДКО, НАЛЕЖАТЬ: **СОНЛИВІСТЬ, ЗАПАМОРОЧЕННЯ, НУДОТА**

- Медикаментозна підготовка пацієнта анестезіологом, ліквідація інтраопераційного стресу, монітор життєво важливих функцій організму під час стоматолікування - запорука успішного післяопераційного перебігу;
- Рекомендації щодо пиття, годування, вживання ліків, транспортування пацієнта після анальгоседації пацієнт та супроводжуюча його особа отримують від анестезіолога та стоматолога;
- Додому слід добиратись легковою машиною під наглядом супроводжуючої особи на задньому сидінні автомобіля. Не слід користуватись громадським транспортом;
- Протягом 24 годин після проведення потенційованого або загального знеболення забороняється керувати транспортним засобом та підписувати юридичні документи;
- В разі виникнення застережень щодо загального стану пацієнта вдома після седації або наркозу просимо по телефону контактувати зі стоматологом або анестезіологом.

**Пайкуш Володимир Андрійович**, кандидат медичних наук, лікар анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії.



+48 22 257 12 871

0443344100

[www.parodent.pl](http://www.parodent.pl)

