


І МЕНІ ВСТАНОЛЕНО ІМПЛАНТ


І ЩО МОЖЕ ВИНΙΚАТИ?

- Незначна слабкість;
- Оніміння після використання місцевої анестезії (протягом 4-6 годин);
- Відчуття тиску на ясна у місці імплантації;
- набряк щоки, помірний ниючий біль у місці імплантації;
- Підвищена температура тіла (до 38).




ЩО МОЖЕ ЗАШКОДИТИ ІМПЛАНТУ (ПЕРШІ 2 ТИЖНІ?)

- Користування у перший місяць електричними зубними щітками;
- Вживання твердої їжі;
- Перепади температур;
- Надмірні фізичні навантаження;
- Вживання алкоголю, гарячої або холодної їжі;
- Тютюнопаління (якщо неможливо відмовитись повністю, слід скоротити кількість цигарок до мінімальної).



“ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ” АБО ЗАГРОЗЛИВІ СИМПТОМИ ПРИ ЯКИХ НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ЗВЕРНУТИСЬ ДО ЛІКАРЯ:

- Біль, набряк щоки, оніміння, що тривають більше 7 днів або посилюються;
- Підвищення температури тіла на 5 день після імплантації;
- Кровотеча з ясен, що не зупиняється;
- Розійшлися шви;
- З'явилась рухливість імпланту, скол зубної коронки.



Вищенаведені ознаки можуть свідчити про розвиток ускладнень, тому при появі будь-якого з них, слід терміново сповістити лікаря-стоматолога та звернутися на огляд!



+48 22 257 12 871

0443344100

www.parodont.pl